



## GENERALIDADES:

**BLAMAGRO 20-20-20** es un fertilizante foliar con alto contenido de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a los cuales se ha incorporado un paquete de micro elementos ligados con lignosulfonatos y ácidos, policarboxílicos.

**BLAMAGRO 20-20-20** es un fertilizante foliar de alta solubilidad lo que permite un ingreso a los tejidos vegetales de manera óptima, corrigiendo inmediatamente las diferencias de los elementos, mejorando rápidamente el desarrollo foliar, vigor y color de los frutos en todos los cultivos.

**BLAMAGRO 20-20-20** por su composición de microelementos esenciales a complejados orgánicamente optimiza la asimilación y metabolización del producto en la planta.

**“AGITAR BIEN ANTES DE USARSE”**

## PRECAUCIONES

**BlamAgro 20-20-20** es de baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente sin embargo se debe tomar las medidas y precauciones recomendadas para la aplicación de agro químicos.

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de Intoxicación inducir el vomito, el tratamiento es sintomático, llevar inmediatamente al médico portando la etiqueta en caso de contacto por tiempo prolongado, usar agua y jabón

## RESPONSABILIDAD CIVIL

Garantiza que el producto es apto para los usos que se recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas, la manipulación del producto no esta bajo el control de la empresa en consecuencia no se responsabiliza por el uso inapropiado del mismo.

**LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENER EL PRODUCTO EN LUGARES LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**RECOMENDACIONES PARA SU EMPLEO: BLAMAGRO 20-20-20** Se aplica en aspersión foliar en mezcla con la cantidad de agua suficiente para una adecuada cobertura del área a tratar.

### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN L/ha	RECOMENDACIONES Y MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Papa, Ají, Tomate, Pimiento	1 - 3	Aplicar durante la primera etapa del desarrollo del cultivo y repetir aplicaciones con intervalos de 15 días
Frijol, arveja, garbanzo, vainita, pallar, haba	1 - 3	Aplicar durante la primera etapa del desarrollo del cultivo y repetir aplicaciones con intervalos de 15 días
Espárrago	1 - 3	Aplicar a los 20 días después de cosecha. Repetir según necesidad cada 15 días. En siembras nuevas aplicar desde las primeras etapas de desarrollo del cultivo.
Trigo, arroz, cebada, avena	1 - 3	Aplicar en pleno macollamiento. Repetir cuando sea necesario.
Maíz	1 - 3	Aplicar durante la primera etapa del desarrollo del cultivo y posteriores aplicaciones pueden efectuarse con intervalos de 15 días.
Cítricos, melocotón, manzano, mango	300cc/200L de agua	Aplicar al inicio de la temporada y repetir 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 20 a 25 días.
Hortalizas	1 - 3	Aplicar durante la etapa de desarrollo vegetativo entre 2 a 3 aplicaciones por temporada.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozcan los resultados de una mezcla, hacer una prueba de compatibilidad previa.